

## Insectenfiche: Kleine klopkever (Anobium punctatum)

Type: Boorder

### Uiterlijke kenmerken 3, 5

gelijkenissen met zachte houtwormkever, bonte knaagkever, schorskever, gekamde houtwormkever, broodkever



Foto: © Anne-Cathérine Olbrechts



Foto: © Anne-Cathérine Olbrechts

Kever:

- 3-5 mm
- donkerbruin met rijen puntjes in de dekschilden
- kop ingetrokken onder borststuk
- hoek in lichaam
- antennes gemiddeld van lengte, laatste segmenten driehoekig



Foto: © Image Courtesy The Food and Environment Research Agency (Fera), Crown Copyright

Larve:

- 6 mm
- gelig-wit
- sikkelvormig



Foto: © M O'Donnell en A. Cline

### Gedrag 1, 2, 3

De kever kan goed vliegen.

### Cyclus 3, 4

3-5 jaar, afhankelijk van omstandigheden en voedingsbodem

### Voedsel 4

- naald- en loofhout, vooral spinthout, zelden kernhout
- verteert cellulose

	<ul style="list-style-type: none"> <li>meubels, maar ook constructiehout, vloeren en houten objecten, boeken</li> </ul>
<b>Schade 3, 5</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>uitvliegopeningen rond 1-2 mm diameter</li> <li>boormeel korrelig en sigaarvormig</li> <li>kenmerken actieve aantasting: <ul style="list-style-type: none"> <li>° uitvliegopeningen en vers boormeel, maar boormeel betekent nog niet altijd dat aantasting actief is</li> <li>° ook scherpe randjes in uitvliegopening, vers boormeel eerder pluizig en licht gekleurd vergeleken met oud</li> </ul> </li> <li>kevers in nabijheid van het voorwerp bij goed onderhouden zone</li> </ul>
<b>Uitvliegperiode 3, 5</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>april-augustus ((een permanent verwarmde ruimte heeft mogelijk een minder grote invloed op de uitvliegperiode)</li> <li>de kever leeft 3-4 weken</li> </ul>
<b>Ideale klimaatcondities 1, 2, 4</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>T: 12-25° C, optimum: 22-23° C</li> <li>RV: &gt; 55%</li> <li>vochtgehalte materiaal &gt;10%</li> <li>optimum vochtgehalte materiaal: 30%</li> </ul>
<p><b>Keuze bestrijdingsmethode 5</b></p> <p>De methode is in eerste instantie afhankelijk van het materiaal dat wordt aangetast. Hier sommen we enkel de meest doeltreffende methodes op, waarbij de meest doeltreffende methode als eerste wordt vermeld.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>voorwerpen: <ul style="list-style-type: none"> <li>hitte</li> <li>vriezen</li> <li>gassen met kooldioxide</li> <li>lage zuurstofconcentratie</li> <li>RV moet onder 55% blijven</li> </ul> </li> <li>gebouwen: insecticide of hitte</li> </ul>
<b>Type geschikte val 3</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>blunderval, plakval of valkuilval zonder lokmiddel</li> <li>plakval of valkuilval met feromoon</li> <li>uv-lichtval</li> </ul>